

پمفت آموزشی

عفونت خون



تهیه و تنظیم: واحد آموزش
با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
پاییز ۱۴۰۱



پیشگیری از عفونت خون

بهترین راه پیشگیری از عفونت خون درمان و پیشگیری از بروز عفونت‌ها می‌باشد.

اگر عمل جراحی داشته‌اید شاید پزشکان برای مقابله با عفونت‌ها انتی‌بیوتیک تجویز نماید بهتر است دوره درمان کامل و از قطع خودسرانه دارو خودداری نمایید. بهتر است زمانیکه به عفونت مشکوک هستید سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

از قرار گرفتن در مکان‌هایی که احتمال مواجهه با باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها زیاد است خودداری نمایید. در صورت وجود زخم در بدن، با تعویض به موقع بانداز و مراقبت از زخم‌ها از عفونت‌انها خودداری نمایید.

داروهای بیمار و عوارض احتمالی آن‌ها

درمان سریع عفونت خون ضروری است زیرا عفونت می‌تواند به سرعت به سایر بافت‌ها و دریچه‌های قلب گسترش یابد و در صورت عفونت شدید خون نیاز به بستری شدن در بیمارستان می‌باشد، به خانواده بیمار متذکر شوید که، در صورت بروز علایمی مثل شوک و رنگ پریدگی، ضربان قلب تند و ضعیف، تنفس تند و سطحی، سرگیجه و عدم هوشیاری و افت فشارخون نیاز می‌باشد بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شود. جهت ثبات فشارخون و کمک به رهایی از شر عفونت‌ها، اکسیژن و مایعات وریدی استفاده خواهد شد. شاید لازم باشد برای شما اکسیژن گذاشته شود بدین صورت که ماسک روی صورت شما گذاشته و یا از طریق لوله ای داخل بینی به شما اکسیژن داده شود.

بر اساس نتیجه آزمایشات و کشت خون پزشک دارو تجویز خواهد نمود. از قطع خودسرانه داروها پرهیز شود.

معمولًا سپسیس با مصرف زیاد مایعات، تزریق داخل وریدی، و آنتی‌بیوتیک‌ها درمان می‌شود.

در صورت سپسیس شدید و از کار افتادن چندین عضو از بدن بر حسب شرایط بیمار نیاز به اقدامات دیگری مثل دیالیز و ... می‌باشد.

عفونت خون(سپسیس)

عفونت خون زمانی ایجاد می شود که باکتری عامل عفونت در یکی از اعضای بدن ، وارد جریان خون شود ، به شکل شدید عفونت خون سپسیس گفته می شود که اگر با درمان مناسب پاسخ داده نشود ، زندگی فرد را تهدید خواهد کرد .

هرگونه عفونت ناشی از باکتری ، قارچ یا ویروس می تواند باعث بروز سپسیس شود . در واقع عفونت خون یک بیماری جدی است که محدود به قسمت های خاصی از بدن نمی شود ، در واقع عفونت خون تمام قسمت هایی از بدن که خون جریان دارد می تواند درگیر کند .

شایع ترین علل ایجاد سپسیس شامل عفونت های شکمی ، عفونت ناشی از نیش حشرات ، عفونت ناشی از لوله های نازک و منعطف که جهت دیالیز یا شیمی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد ، کشیدن دندان و عفونت دندان ، قرار گرفتن زخم ناشی از عمل جراحی در معرض باکترها یا عوض نکردن بموقع باندаж یا قرار گرفتن زخم های باز درمعرض محیط از سایر علل ایجاد سپسیس می باشد .

علایم سپسیس


- *تب و لرز یا کاهش شدید دمای بدن
- *تنفس تندر

*افزايش ضربان قلب و تپش قلب

*رنگ پريديگي خصوصا در ناحيه صورت

در صورت پیشرفت بیماری علایمی مانند:

- *کاهش سطح هوشياری و گيجي و هذيان
 - *عدم دفع ادرار يا توليد اندک ادرار
 - *شوك و افت فشارخون
 - *راش هاي پوستي و خونریزی هاي زير پوستي وجود دانه هاي قرمز در سطح پوست
- راه های تشخيص عفونت خون عبارتند از:
- *آزمایش خون
 - *آزمایش خلط، ادرار، مایع نخاعی و یا محتويات آبشه
 - *تصویربرداری از قفسه سینه برای بررسی ذات الریه
 - *سی تی اسکن



تا زمان درمان کامل بیماری استراحت کافی داشته باشد

و از انجام فعالیت های بدنی سنگین و انجام ورزش های

سنگین خود داری نماید و بین فعالیت ها حتما

استراحت کافی داشته باشد.

تعذیبه در سپسیس

رزیم غذایی سرشار از پروتئین (تخم مرغ و شیر و....)

صرف مایعات فراوان با توجه به دفع مایعات بدن از

طریق تب و تعریق و عدم نوشیدن مایعات کافی بیمار

دچار کم آبی و افت فشار خون و کاهش یا قطع ادرار و

تیره شدن رنگ ادرار و احتمال ایجاد عفونت های دیگر

در بدن مانند عفونت های ادراری می شود .

جهت تقویت سیستم ایمنی بدن از مواد سرشار از

ویتامین خصوصا ویتامین ث مانند توت فرنگی ، کلم

بروکلی ، گریپ فروت ، گوجه فرنگی ، آنه ، لیمو ، هندوانه

، سیب زمینی ، کیوی ، اسفناج و کلم استفاده نمائید .

از مصرف مکمل های آهن بدون نسخه پزشک در ایام

بیماری خودداری نمائید (آهن منبع مناسبی جهت رشد

باکتریها می باشد و مصرف مکمل های آهن باعث

تشدید عفونت خواهد شد و ممنوع می باشد