




نور شهریار

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

کور تاژ



معرفی بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار

ضمن تشکر از اینکه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار را برای اقدامات درمانی خود انتخاب نموده اید.

این مرکز به عنوان بیمارستان جنرال ۲۰۰ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی با داشتن کلیه خدمات تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور و استان تهران می باشد که در ۷ طبقه و بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع طراحی شده است.

این مرکز همواره امیدوار است با کمک تجهیزات پیشرفته، دانش به روز و کادر تخصصی درمان، در بهبود و ارتقا سلامت مردم شریف منطقه نقشی اساسی داشته باشد.



معرفی دپارتمان های تخصصی و فوق تخصصی

- *جراحی مغز و اعصاب
- *جراحی قلب باز
- *فیزیوتراپی (الکتروتراپی، تمرین درمانی، درمان خار پاشنه و ...)
- *آنژیوگرافی
- *جراحی فک و صورت
- *جراحی پلاستیک و زیبایی
- *جراحی اطفال
- *تصویب برداری (رادیولوژی، سونوگرافی، MRI ، CT Scan، فلورسکوپی، ماموگرافی، تراکم استخوان، OPG)
- *جراحی توراکس
- *آزمایشگاه و پاتولوژی
- *اطفال
- *دیالیز
- *NICU و نوزادان
- *داخلی
- *درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی سرپایی
- *ریه
- *جراحی عمومی
- *اورژانس شبانه روزی
- *زنان و زایمان
- *جراحی لاغری (اسلیو، بای پس)
- *پزشکی هسته ای (اسکن قلب، تیروئید و ...)
- *داخلی مغز و اعصاب
- *جراحی کلیه و مجاری ادراری
- *کلینیک درد
- *غدد
- *داروخانه
- *آندوسکوپی و کلونوسکوپی
- *جراحی چشم
- *سنگ شکن
- *جراحی گوش و حلق و بینی
- *جراحی ارتوپدی

بمنظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، شماره های ذیل آماده ثبت انتقادات و نقطه نظرات شما مراجعین محترم می باشد:

شماره تماس: (داخلی ۱۰۳۵) ۰۲۱۶۵۵۷۷۰۰۱-۱۰

(داخلی ۱۰۳۵) ۰۲۱۵۴۱۲۱

واتساپ: ۰۹۰۵۴۹۳۰۵۵۰

اینستاگرام: noorhospital_shahriyar

تلگرام: noorhospital_shahriyar

آدرس سایت: www.noorhospital.ir

تهیه و تنظیم: واحد آموزش

با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

پاییز ۱۴۰۱

باز کردن دهانه ی رحم و تخلیه ی نسج آن را گویند این عمل یکی از شایع ترین عمل های زنان است و می تواند برای تشخیص یا درمان خون ریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.

خون ریزی غیر طبیعی زنان چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خون ریزی غیرطبیعی از واژن (مهبلی) گردد. خون ریزی غیر طبیعی به خون ریزی گفته می شود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد.

موارد خون ریزی غیر طبیعی زنان:

- ☒ بعد از تماس جنسی.
- ☒ هنگام یائسگی یا بعد از آن .
- ☒ در بین دو دوره ی قاعدگی به صورت لکه بینی.
- ☒ ترشح خونی از واژن یا خون ریزی در نیمه ی اول حاملگی.
- ☒ خون ریزی قاعدگی با فواصل منظم و حجم زیاد همراه با دفع لخته.
- آموزش های قبل از عمل:
- ☒ هشت ساعت قبل از عمل چیزی نخورید ، در صورت اورژانسی بودن عمل به محض اطلاع از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.
- ☒ در صورتی که عمل شما خیلی اورژانسی نیست ، قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال عفونت ، استحمام کنید و لازم است موهای ناحیه ی عمل ، قبل از جراحی تراشیده شود.
- ☒ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات ، اجسام فلزی ، گیره ی سر ، لنز ، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.
- ☒ کلیه ی لباس ها ، حتی لباس زیر و جوراب های خود را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید.
- ☒ لاک ناخن ها و آرایش خود را پاک کنید.
- ☒ قبل از خروج از بخش حتما ادرار خود را تخلیه کنید.

آموزش های حین عمل:

عمل کورتاژ ضمن بی هوشی عمومی یا بی حسی ناحیه ای انجام می شود و برای دسترسی آسان به رحم شمارا در وضعیت مناسبی قرار می دهند.

ابتدا دهانه ی رحم را باز می کنند ؛ در صورتیکه علت خون ریزی سقط است ، محصولات حاملگی را خارج می نمایند و اگر علت خون ریزی نامعلوم است از بافت دهانه ی رحم و رحم نمونه (بیوپسی) برمی دارند .

اگر پزشک شما ناحیه ی مشکوکی را یافت ، او ممکن است یک بخش یا همه ی آن را خارج کند و جهت پاتولوژی بفرستد. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش می کند، تا سرطان یا دیگر بیماری های احتمالی را تشخیص دهد.

توجه داشته باشید عمل کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت ، بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید .

آموزش بعد از عمل :

۱. بعد از عمل از انجام کارهای سنگین و برداشتن اجسام سنگین خودداری کنید.

۲. به مدت ۴ هفته از تماس جنسی خودداری کنید.

۳. در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده ، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا ۳ ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود.

۴. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

۵. قبل از ترخیص از پرستار بخش مدت زمان آماده شدن جواب پاتولوژی را جویا شوید تا در اسرع وقت جواب را پیگیری نمایید.

۶. ملاقات مجدد با پزشک خود داشته باشید و جواب نمونه را به او اطلاع دهید.

. بعد از کورتاژ از غذاهای سرشار از آهن (مانند : گوشت قرمز ، جگر ، تخم مرغ ، غلات ، سبزیجات دارای برگ تیره به ویژه اسفناج، جعفری، کلم به ویژه کلم بروکلی، حبوبات به ویژه عدس ، کشمش سبز) استفاده نموده و از مصرف چای و لبنیات همراه با غذاهای پروتئینی اجتناب شود و به جای آن منابع ویتامین سی مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و مرکبات همراه با غذای پروتئین مصرف شود.

در صورت نیاز، برای جبران کم خونی خود قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت ۳ ماه استفاده نمایید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:

۱. تب
۲. ترشحات زیاد و غیرطبیعی
۳. درد زیاد در قسمت زیر شکم
۴. افزایش خون ریزی
۵. ترشحات بدبو
۶. هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی ، ضعف ، بی حالی و غیره