




نور شهریار
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

پیلو نفریت



تهیه و تنظیم: واحد آموزش
با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
پاییز ۱۴۰۱


معرفی بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار

ضمن تشکر از اینکه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار را برای اقدامات درمانی خود انتخاب نموده اید.

این مرکز به عنوان بیمارستان جنرال ۲۰۰ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی با داشتن کلیه خدمات تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور و استان تهران می باشد که در ۷ طبقه و بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع طراحی شده است.

این مرکز همواره امیدوار است با کمک تجهیزات پیشرفته، دانش به روز و کادر تخصصی درمان، در بهبود و ارتقا سلامت مردم شریف منطقه نقشی اساسی داشته باشد.



بمنظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، شماره های ذیل آمده ثبت انتقادات و نقطه نظرات شما مراجعین محترم می باشد:

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۵۷۷۰۰۱-۱۰ (داخلی ۳۵)
۰۲۱۵۴۱۲۱ (داخلی ۳۵)

واتس‌اپ: ۰۹۰۵۴۹۳۰۵۵۰

ایнстاستاگرام: noorhospital_shahriyar

تلگرام: noorhospital_shahriyar

آدرس سایت: www.noorhospital.ir

معرفی دپارتمان های تخصصی و فوق تخصصی

- * جراحی قلب باز
- * آنژیوگرافی
- * جراحی فک و صورت
- * جراحی اطفال
- * جراحی توراکس
- * داخلی
- * جراحی عمومی
- * جراحی لاغری (اسلیو، بای پس)
- * جراحی کلیه و مجاري ادراری
- * جراحی چشم
- * جراحی گوش و حلق و بینی
- * جراحی ارتوپدی
- * فیزیوتراپی (الکتروتراپی، تمرین درمانی، درمان خار پاشنه و ...)
- * جراحی پلاستیک و زیبایی
- * تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، MRI، CT Scan)
- * ICU
- * فلورسکوپی، ماموگرافی، تراکم استخوان، OPG و نوزادان NICU*
- * آزمایشگاه و پاتولوژی
- * دیالیز
- * زنان و زایمان
- * شناوایی سنجی
- * داخلی مغز و اعصاب
- * فوق تخصصی سرپایی اورژانس شبانه روزی
- * غدد
- * آندوسکوپی و کلونوسکوپی
- * سینگ شکن
- * داروخانه

پیلونفریت چیست؟

عفونت کلیه در اثر هجوم باکتری به کلیه اتفاق افتاده و به نام پیلونفریت معروف است و شامل انواع پیلونفریت حاد و مزمن می‌باشد. بعضی اوقات عفونت کلیه به شکل آبse کلیه می‌باشد.

پیلونفریت یک عفونت باکتریایی است که به علت عملکرد مهم کلیه‌ها می‌تواند وخیم باشد. همچنین عفونت می‌تواند وارد خون شود. عفونت‌های کلیوی در زنان بیشتر از مردان است.

علایم

شروع ناگهانی تب و لرز درد یک طرفه یا دو طرفه پهلو علائم عمومی (سردرد، درد عضلانی و ضعف عمومی و بیحالی)

سوژش ادرار، تکرر ادرار و فوریت در ادرار کردن ادرار کدر یا خونی بدبو، تهوع و استفراغ درد شکمی (کودکان معمولاً درد پهلو ندارند و از درد شکمی شکایت دارند)

پیلونفریت حاد

بیماری به یک باره ایجاد می‌شود در پیلونفریت شدید اندازه کلیه‌ها بزرگ شده و در صورت درمان کامل قابل برگشت است.

معمولًا عامل عفونت‌زا از بخش‌های پایینی دستگاه ادراری به بالا صعود می‌کند و سبب درگیری کلیه می‌شود. وجود ریفلاکس (برگشت ادراری به کلیه) موجب افزایش ریسک پیلونفریت حاد می‌شود.

پیلونفریت مزمن

پیلونفریت مزمن که در صورت تکرار پیلونفریت حاد و درمان ناقص آن ایجاد می‌شود و نیاز به درمان طولانی و دقیق و پیگیری بیشتری دارد در غیر اینصورت خطر نارسایی کلیه را به دنبال خواهد داشت.

آموزش‌های لازم

روش‌های پیشگیری از عفونت ادرار را رعایت کنید. به طور منظم مثانه خود را تخلیه کنید. از نگه داشتن طولانی مدت ادرار و اتساع مثانه خودداری کنید.

قبل و بعد از توالت دست‌های خود را بشویید.

به خانم‌ها توصیه می‌شود که فاصله بین مقعد و مجرای ادرار را از جلو به عقب بشویند. خشک و تمیز نگه دارند.

برای جلوگیری از عفونت و یا عفونت مجدد قبل و بعد از آمیزش جنسی ادرار کنید
لباس زیر نخی بپوشید و آن را در آفتاب خشک کنید و یا آن را اتو بکشید

از پوشیدن لباس زیر نایلونی خودداری کنید.

لباس‌های گشاد بپوشید و از پوشیدن لباس‌های چسبناک خودداری کنید. پ

روزانه ۱۰-۱۵ لیوان مایعات رقیق مثل آب، عصاره آلو، عصاره زغال اخته، آبلیموی شیرین و لیموترش بنوشید.

از مصرف نوشیدنی‌هایی مانند قهوه، چای، نوشابه‌های کولا، الكل خودداری کنید.

در صورتی که آنتی بیوتیک مصرف می‌کنید از مصرف آب گریپ فروت و انگور خودداری کنید زیرا ممکن است با برخی از آنتی بیوتیک‌ها تداخل داشته باشد

آن‌تی بیوتیک خود را ادامه دهید حتی اگر احساس کردید بهتر شده‌اید. پس از تاریخ معین جهت انجام آزمایش و پیگیری درمان مراجعه نمایید. در صورتی که به صورت سرپایی تحت درمان هستید، تاریخ مراجعه بعدی را از پزشک خود سوال کنید

عوامل زمینه ساز بیماری

عفونت مثانه که کامل درمان نشده باشد
افتادگی مثانه
بارداری

بزرگی پروستات

سنگ‌های ادراری

روش‌های درمان درمان سرپایی:
در صورتی که تهوع و استفراغ نداشته و کم آب نشده باشد و حال عمومی شما خوب باشد به صورت سرپایی درمان می‌شود لازم است تمامی داروهای را طبق دستور پزشک و سر ساعت مصرف کنید. معمولاً از آنتی بیوتیک‌ها برای دوره دو هفته‌ای استفاده می‌شود.

درمان در زمان بستری در بیمارستان:

در این صورت آنتی بیوتیک داخل وریدی دریافت می‌کنید و پس از اینکه علائم بهبودی در شما ظاهر شد و تب نداشته‌ید آنتی بیوتیک خوراکی برای شما شروع خواهد شد.

عوارض بیماری

افزایش فشار خون

تشکیل سنگ‌های کلیوی
از کار افتادن کلیه‌ها و نیاز به پیوند کلیه

دیالیز دائمی

پیگیری درمان