




**نور شهریار**

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

# پمفت آموزشی ترومبوز ورید عمقی



تهیه و تنظیم: واحد آموزش  
با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی  
پاییز ۱۴۰۱

## معرفی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار

ضمن تشکر از اینکه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار را برای اقدامات درمانی خود انتخاب نموده اید.

این مرکز به عنوان بیمارستان جنرال ۲۰۰ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی با داشتن کلیه خدمات تخصصی کلینیکی و پاراکلینیکی یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور و استان تهران می باشد که در ۷ طبقه و بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع طراحی شده است.

این مرکز همواره امیدوار است با کمک تجهیزات پیشرفته، دانش به روز و کادر تخصصی درمان، در بهبود و ارتقا سلامت مردم شریف منطقه نقشی اساسی داشته باشد.



بمنظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، شماره های ذیل آمده ثبت انتقادات و نقطه نظرات شما مراجعین محترم می باشد:

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۵۷۷۰۰۱-۱۰ (داخلی ۱۰۳۵)  
۰۲۱۵۴۱۲۱ (داخلی ۱۰۳۵)

واتساب: ۰۹۰۵۴۹۳۰۵۵۰

ایнстاگرام: noorhospital\_shahriyar

تلگرام: noorhospital\_shahriyar

آدرس سایت: www.noorhospital.ir

## معرفی دپارتمان های تخصصی و فوق تخصصی

- \* جراحی قلب باز
- \* آنژیوگرافی
- \* جراحی پلاستیک و زیبایی
- \* تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، MRI، CT Scan)
- \* فلورسکوپی، ماموگرافی، تراکم استخوان، OPG )
- \* آزمایشگاه و پاتولوژی
- \* دیالیز
- \* زنان و زایمان
- \* شناوری سنجی
- \* داخلی مغز و اعصاب
- \* اورژانس شبانه روزی
- \* پزشکی هسته ای (اسکن قلب، تیروئید و ...)
- \* آندوسکوپی و کلونوسکوپی
- \* کلینیک درد
- \* سنگ شکن
- \* داروخانه
- \* جراحی لاغری (اسلیو، با پس )
- \* جراحی کلیه و مجاري ادراری
- \* جراحی چشم
- \* جراحی گوش و حلق و بینی
- \* جراحی ارتوپدی

ترمبوز ورید عمقی یا DVT چیست؟  
به معنای تشکیل لخته خونی در دیواره های داخلی یک سیاهرگ عمقی است که معمولاً در پشت ساق یا جلوی ران به وجود می آید که با پیشرفت بیماری ممکن است باعث مسدود شدن نسبی یا کامل عروق خونی می گردد.

### عوامل افزایش دهنده خطر:

- \* استراحت در بستر
- \* چاقی

جراحیهای اخیر (بخصوص جراحی مفصل ران و زانو)  
\* زایمان در ۶ ماه گذشته

\* سرطان

\* شکستگی در لگن و پا

\* سابقه خانوادگی ابتلا به DVT

\* علایم

\* احساس درد یا حساسیت در پا بخصوص در زمان راه رفتن یا ایستادن  
\* ناحیه متورم در پا

\* افزایش گرما در ناحیه ای از پا که متورم یا دردناک است  
\* پوست قرمز یا رنگ پریده

در حین درمان در صورت بروز هر یک از علایم، زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

\* درد قفسه سینه

\* سرفه خونی

\* مشکلات تنفسی

\* غش و از دست دادن هوشیاری

نکاتی در مورد داروهای ضد انعقاد در صورتی که از وارفارین و هپارین استفاده میکنید:

\* در صورت نیاز به ریش تراش، از ریش تراش برقوی بجائی تیغ استفاده شود.

\* از مسواک نرم استفاده کنید.

\* از انجام تزریقات عضلانی و زیر جلدی تا حد امکان اجتناب شود.

در صورت نیاز به تزریقات، محل آن را به مدت ده دقیقه فشار دهید  
در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک مراجعه نمایید: خونریزی از بینی و لشه و خلط خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع قرمز یا قیری رنگ، خونریزی طولانی از محلهای بریدگی، خونریزی قاعده‌گی زیاد، کبودی روی پوست، تب و لرز خستگی، زخم گلو، تهوع و استفراغ

درمان ها و مراقبت های لازم که باید به دقت به آنها توجه نمایید:  
استراحت در بستر و بالا بردن اندام مبتلا بالاتر از سطح قلب

در صورت درد، تورم، قرمزی، گرمی و حساسیت اندام مبتلا در لمس هر چه سریعتر به پزشک خود مراجعه نمایید.

مایعات کافی بنوشید و میوه جات و سبزیجات مصرف کنید تا مجبور نباشد برای دفع مدفوع به پاهای خود فشار بیاورید.

مطابق تجویز پزشک از مسکن (مثل استامینوفن کدئین) و داروهای ضد انعقادی استفاده کنید زمانیکه در بستر استراحت می کنید مرتبا پهلو به پهلو شوید تا دچار زخم بستر نشود. سرفه های موثر انجام داده و نفسهای عمیق بشکید.

از ماساژ دادن یا مالیدن قسمت عضلانی ساق پا خودداری کنید چون احتمال کنده شدن لخته و حرکت آن در مسیر جریان خون و خطرمرگ وجوددارد.

هنگام استراحت در بستر، میتوانید تمرینات ورزشی مانند به عقب خم کردن کف پا را انجام دهید.

در مدت زمانیکه فقط دستور استراحت در تخت را دارید کشیده اید،

